

PRZYGOTOWANIE DO GASTROSKOPII

Gastroskopia to podstawowe badanie profilaktyczne, które pozwala ocenić przełyk, żołądek i opuszkę dwunastnicy. Wskazaniami do gastroskopii są m.in. zgaga, ból brzucha, stany zapalne żołądka i przełyku.

Przebieg badania:

Na badanie zabrać ze sobą dowód osobisty, skierowanie, kartę wypisu ze szpitala z powodów gastrologicznych, wynik poprzedniej gastroskopii.

Przed badaniem należy zdjąć okulary oraz wyjąć protezy zębowe. Następnie gardło zostaje znieczulone lekiem w postaci aerozolu, co pozwala ograniczyć dyskomfort związany z wprowadzaniem aparatu.

Badanie gastroskopii jest wykonywane w pozycji leżącej, na lewym boku, z głową przygiętą do klatki piersiowej. Gastroskop jest wprowadzany przez ustnik, który badana osoba trzyma zębami do końca trwania badania. Podczas całego badania nie należy połykać śliny, która spływa swobodnie do śliniaka. Powinno się swobodnie i miarowo oddychać. Z uwagi na to, że w trakcie gastroskopii do żołądka wprowadzana jest niewielka ilość powietrza, pojawić się może uczucie wzdęcia i odbijania. Są to zjawiska normalne w trakcie gastroskopii i ustępują zaraz po jej zakończeniu. Czas badania jest indywidualnie zmienny i przeciętnie wynosi kilka minut. Po badaniu nie należy jeść i pić przez godzinę.

Wskazania:

- utrudnienia połykania - ich przyczyną mogą być zmiany zapalne w przełyku lub zaburzenia motoryki o charakterze rozlanych skurczów
- zgaga- jej najczęstszą przyczyną jest zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej do przełyku. Może być również spowodowana przez zaburzenia opróżniania żołądka w przebiegu choroby wrzodowej
- Przewlekłe zapalenie żołądka
- Wymioty
- Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego
- niedokrwistość
- niewyjaśniona utrata masy ciała
- podejrzenie obecności ciał obcych
- dolegliwości bólowe w okolicy nadbrzusza

Przygotowanie :

- 7- 8 godzin przed badaniem gastroskopii nie należy nic jeść;
- 4 godziny przed badaniem nie należy nic pić, palić papierosów, żuć gumy;
- Osoby stale przyjmujące leki np. na nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczkę, powinny zażyć normalną dzienną dawkę swoich leków popijając małą ilością wody.

Przeciwwskazania:

- Brak zgody pacjenta ,
- brak współpracy z pacjentem
- Silna infekcja angina , wirus opryszczki,
- Podejrzenie perforacji
- Świeżo przebyty zawał serca,